

Préparation de pilulier

7 erreurs à ne pas commettre



1

L'interruption de tâche

Ne vous laissez pas distraire. **La préparation d'un pilulier nécessite une grande concentration.** L'interruption de tâche est la principale source d'erreurs lors de l'administration des médicaments.



2

La contamination croisée

Travaillez dans des conditions d'hygiène optimales. La contamination croisée intervient lorsqu'un médicament entre en contact avec une substance altérant sa qualité ou présentant un risque pour le patient (bactéries, virus...).



3

L'incohérence de prescription

Doublons, interactions médicamenteuses, modification du traitement en cours de route... **Rassemblez et croisez les différentes ordonnances** de votre patient pour réduire le risque d'erreur.



4

La confusion de patient


Oui, cela arrive ! Vérifiez systématiquement que **le nom figurant sur l'ordonnance** que vous avez sous les yeux est bien celui de votre patient.



5

La péremption de médicament

Un médicament périmé n'est pas forcément dangereux, mais il risque en revanche d'être inefficace. **Vérifiez toujours la date de péremption** mentionnée sur la boîte de médicament.



6

L'erreur de casting

Anticancéreux, AVK, stupéfiants, comprimés effervescents, capsules molles... **Certains médicaments ne doivent jamais être mis dans un pilulier !**

[En savoir plus >](#)



7

L'absence de contrôle

Le respect des 6 points précédents n'empêche pas de commettre une erreur ! **Opérez systématiquement un double contrôle** : contrôle visuel de l'aspect général du pilulier puis contrôle numérique du nombre de comprimés par alvéole.



La préparation de vos piluliers peut également être confiée à un pharmacien, avec une garantie de traçabilité des médicaments et de conformité au traitement.

Captain Pharma prépare vos piluliers selon une procédure automatisée, avec un double contrôle humain et une livraison à Paris et sa proche banlieue.

Envie d'en savoir plus ?

[Contactez-nous ! >](#)